

LES PETITS SONT DEPLUMES PAR LES PARENTS

Après une période de 20 à 25 jours les oisillons sortent du nid. Les parents, de nouveaux excités, veulent entreprendre une nouvelle nichée. Faut de matériaux pour reconstruire un nid, ils (mais le plus souvent la femelle) déplument les jeunes. Dès les premières sorties des petits du nid, vous devez nettoyer le nid et mettre à la disposition des parents de la fibre de coco.

QUAND SEVRER LES JEUNES

Les jeunes mandarins seront laissés avec leurs parents encore deux semaines environ. La couleur du bec commencera à changer. Elle passera du noir au rouge ou à l'orange rouge. Vous pourrez alors séparer les petits et les mettre dans une autre cage ou volière où ils pourront s'épanouir. Après une seconde nichée, menée à terme, les parents seront séparés et mis au repos. Il est inutile de fatiguer ceux-ci par des pontes successives et inutiles, ils vous donneront d'autres jeunes la saison suivante.

POURQUOI BAGUER

La bague à la patte d'un oiseau est comme une carte d'identité, elle est l'équivalent à un tatouage de votre chien ou chat. Elle vous servira au suivi de votre élevage, à la tenue d'un cahier d'élevage. Elle vous permet d'identifier la provenance de l'oiseau et son année de naissance.

COMMENT BAGUER

Entre le sixième et le huitième jour de l'oiseau, il faudra lui passer une bague fermée. L'opération est un peu délicate la première fois. Faites-vous aider si nécessaire par une personne plus expérimentée. Les diamètres de bagues préconisés sont de 2,7mm voir 2,9mm.


Millésime Sigle de l'entité nationale

1997 UOF

F 45 001 11 2028

France Diamètre en 1/10ème de mm/mm N° de l'oiseau N° de l'entité régionale N° de souche de l'éleveur

F 4,5mm de 001 à 999 Ile de France = 11 2028 = l'éleveur



CLUB TECHNIQUE MANDARIN

Affilié à l'Union Ornithologique de France UOF COM France

Vous voulez ou vous venez d'acquérir un couple de

DIAMANT MANDARIN

Ce document peut vous être utile ...

CLASSIFICATION - REPARTITION

Ordre des Passériformes


Famille des Estrilidés

Nom latin : *Poephila guttata* Castanotis


Le mandarin vit en Australie, à l'exclusion des régions côtières de la Nouvelle Galle du sud et du Victoria. Une sous-espèce vit à Timor.



COMMENT DISTINGUER UN MALE D'UNE FEMELLE



Mâle



Femelle

Le mâle se distingue facilement de la femelle par la présence :

- ✓ d'une barre de poitrine
- ✓ de zébrures situées entre la barre de poitrine et le dessous du bec
- ✓ de dessins de joues
- ✓ de dessins de flancs orangés marqués de points blancs

La différence chez les mandarins de couleur blanche, est quelquefois plus difficile, seule la couleur du bec permet de sexer les oiseaux :

- ✓ Rouge-coral chez le mâle.
- ✓ orange-rouge chez la femelle.

LES MUTATIONS

Beaucoup de mutations apparurent et furent conservées.
La plupart des variétés ont vu le jour au vingtième siècle.
La plus ancienne fut le mandarin blanc (1920), puis la couleur brune (1955).
Vinrent ensuite : le gris pastel ; le masque ; les poitrines blanches (les mâles n'ont plus de zébrures et barres de poitrine, d'où l'appellation).
Les panachés sont apparus au Danemark (1935).
Les mutations plus récentes s'appellent : Poitrine noire (1968) ;
Black face ; Joues grises et joues brunes ; Joues noires ; Poitrine orange ;
Agate ; Joues claires et les Frisés.
À l'heure actuelle nous recensons plus de 60 mutations ou combinaisons de mutations.

LA CAGE IDEALE

Elle devra être la plus spacieuse possible, de forme rectangulaire afin de pouvoir accrocher un nid à l'extérieur pour que les futurs parents puissent disposer de toute la place à l'intérieur. Une cage de 40 à 50 cm peut leur suffire. La dimension du nid sera de 15x15x10 cm avec un volet pivotant pour contrôler l'intérieur du nid et le baguage des jeunes.

NOURRITURE

Vous trouverez dans le commerce des mélanges de graines pour exotiques d'excellentes qualités. Il est nécessaire d'y ajouter de la graine d'alpiste, vos protégés s'en porteront beaucoup mieux.
Avant la période des accouplements, une préparation des oiseaux est souhaitable. Pour cela, il faut donner de la pâtée (que vous trouverez aussi dans le commerce) une ou deux fois par semaine. Puis, lorsque les oisillons seront nés, augmentez le volume de cette pâtée d'élevage, très légèrement humidifiée, et distribuez-la tous les jours.
Une bouteille contenant de l'eau sera fixée près d'un perchoir. L'eau devra être changée tous les jours ou tous les deux jours en fonction de la température ambiante.
Un os de seiche sera accroché en permanence à la façade de la cage.
Le millet en grappe est très apprécié.
Le sable anisé de fond de cage sera changé une fois par semaine.

LE BAIN

Le bain sera donné tous les deux jours au minimum et de préférence le matin. Choisissez la baignoire extérieure. L'oiseau aime se baigner. Regardez les oiseaux de la nature : même en plein hiver, ils profitent d'une flaque d'eau froide pour se laver.

QUAND METTRE LE NID ?

La saison de reproduction se situe en hiver chez le mandarin élevé en cage ou volière intérieure, dans un local tempéré, mais elle pourra être repoussée au printemps si vous désirez élever en volière extérieure.
Le nid, préalablement garni de foin, sera accroché à l'extérieur de la cage une semaine après avoir formé votre couple. Vous fournirez des fibres de coco, ou de la charpie que les oiseaux s'empresseront de mettre dans le nid. La ponte suivra de quelques jours. Quatre à cinq œufs seront pondus, un par jour, et couvés indifféremment par les deux parents. Un critère important est le choix du nid. Il faudra demander à l'éleveur vous cédant les oiseaux, quel modèle de nid il utilise. Les mandarins habitués à un modèle de nid entreprendront plus facilement une nichée dans un nid de même type.

LA FEMELLE NE COUVE PAS OU RECOUVRE SES ŒUFS DE FIBRE

Il arrive que certaines femelles ne couvent pas, ou systématiquement recouvrent les œufs de fibre de coco. En général, ce sont des oiseaux mal préparés, ou trop excités et qui veulent absolument répondre.
Il faut retirer le nid et laisser reposer les oiseaux ; reprendre la préparation et recommencer le cycle normal. Dès la ponte du premier ou deuxième œuf, vous devez supprimer la pâtée. Ne plus donner de fibre de coco dans la cage.

LES PETITS TOMBENT DU NID

Après 13 jours environ de couvaison, les premiers petits naissent avec un léger duvet. C'est une période excitante et cruciale pour les éleveurs débutants.
La tentation est grande de regarder toutes les 5 minutes ce qu'il se passe dans le nid. Des parents trop jeunes et nerveux rejettent les petits ou les entraînent involontairement lors de leur sortie précipitée du nid. Replacer les petits et surveillez discrètement l'évolution sans abuser. Redonner de la pâtée d'élevage tous les jours.